

## علائم بیماری در انسان

- ✓ تب مداوم و مستمر
- ✓ عرق فراوان بخصوص شبها
- ✓ سردرد ، دردمفاصل ، عضلات و استخوانها



## راههای سرایت بیماری

- انتقال بیماری به طور معمول از حیوان آلوده به انسان روی می دهد و انتقال از انسان به انسان بسیار نادر است.
- ✓ تماس با گوشت ، خون ، ادرار ، جنین سقط شده دام و بخصوص جفت آلوده حیوان آلوده به بیماری .
  - ✓ خوردن شیر نجوشیده ، پنیر تازه ، سبزی های تازه بخصوص اگر در خاک دارای کود حیوان آلوده رشد کنند ، می توانند سبب بیماری شوند.
  - ✓ انتقال از طریق استنشاق هوای آغل ، اصطبل و آزمایشگاه

## بروسلوز (تب مالت)

بیماری تب مالت یا بروسلوز یک بیماری مهم مشترک بین انسان و دام می باشد و در انسان به شکل تب مالت و در دامها به صورت سقط جنین مشاهده می شود . مهمترین راه ورود میکروب به بدن حیوان از طریق دستگاه گوارش است که به وسیله علوفه آلوده و زباله به حیوان سرایت می کند .



این بیماری بیشتر در مناطق سردسیر و معتدل در تمامی فصول و بیشتر در فصلهای بهار و تابستان که فصل زایش و شیردهی دامها می باشد ، قدرت آلودگی کنندگی بیشتری دارد و کشاورزان ، دامپروران ، قصابان ، سلاخان ، دامپزشکان و کارکنان آزمایشگاه بیشتر در معرض خطر ابتلا به این بیماری هستند.



# تب مالت (بروسلوز)



گروه هدف: عموم مردم

شبکه بهداشت و درمان شهرستان قدس

واحد آموزش و ارتقای سلامت



## دوره نهفتگی:

وقتی که برخورد با منبع عفونت مستمر باشد ، چه از راه نوشیدن شیرخام و یا تماس شغلی ، تعیین زمان دقیق آلودگی و لذا دوره نهفتگی مشکل خواهد بود. اما در مواردی که عفونت به دنبال یک تماس مشخص باشد ، دوره نهفتگی اغلب بین ۱ تا ۳ هفته می باشد. گاهی اوقات بین ۶ تا ۱۷ ماه نیز گزارش شده است .



تب مالت منتقله از طریق گاو نسبت به تب مالت گوسفندی از شدت کمتری برخوردار می باشد.

## تشخیص:

تشخیص قطعی تب مالت با آزمایش خون انجام می گیرد و با درمان کامل معمولاً در ۳ تا ۴ هفته بهبودی دیده می شود . اطرافیان و اعضای خانواده شخص بیمار که ممکن است از همان غذای آلوده مصرف کرده باشند ، باید معاینه شده و آزمایش بدهند .



## درمان:

درمان شامل یک دوره استراحت در رختخواب و مصرف آنتی بیوتیک است و جدا کردن بیمار از دیگران اغلب لازم نیست و داروهای کاهنده التهاب استفاده می شود . برای درد عضلانی نیز از داروهای ضد درد (مُسکن) تجویز می شود.

## پیشگیری:

- ✓ دامداران عزیز با مشاهده سقط در دامهای خود با هماهنگی بهورز خانه بهداشت ، نسبت به شناسایی و ثبت مشخصات دام و اطلاع به ایستگاه دامپزشکی کمک شایانی در کنترل و مبارزه با بیماری تب مالت انجام می دهند .
- ✓ پنیر تازه باید حداقل به مدت دو ماه در آب نمک نگهداری شود و پس از آن مورد استفاده قرار گیرد.
- ✓ قبل از دوشیدن شیر باید حتما پستان دام و اطراف آن را با آب صابون بخوبی شستشو داد .
- ✓ در صورت عدم دسترسی به شیر پاستوریزه قبل از مصرف آنرا به مدت ۲۰ دقیقه جوشانده و در حین جوشاندن مرتب به هم بزنید تا تمام شیر حرارت لازم را ببیند.
- ✓ از مصرف خامه و بستنی و کسک غیر پاستوریزه خودداری نمایید.
- ✓ از تماس مستقیم با فتهای آلوده حیوان خودداری نمایید .
- ✓ واکسیناسیون منظم و دوره ای دامها نیز در پیشگیری از بروز این بیماری موثر است.

تلفن ارتباط با ما : ۰۲۱۶۸۱۶۹۲۴