

- تب خونریزی دهنده کریمه - کنگو از طریق گزش کنه ، تماس با خون ، گوشت ، ترشحات حیوان آلوده و تماس با انسان بیمار منتقل می شود .
- دام مورد نیاز خود را جهت نگهداری یا کشتار ، از مراکز مورد تایید سازمان دامپزشکی تهیه نمایید .
- از گوشت های فاقد مهر دامپزشکی استفاده نشود.
- از تماس با خون و ترشحات دام کشتار شده پرهیز و در هنگام ذبح یا زایمان دام از دستکش استفاده نمایید.
- در صورت مشاهده کنه روی سطح بدن از له کردن آن با دست خودداری کنید.
- در صورت استفاده از گوشت دام ، پیش از مصرف به مدت ۲۴ ساعت در یخچال (دمای صفر تا چهار درجه) نگهداری شود.
- در صورت تماس مستقیم با خون تازه و یا سایر بافت های دام و حیوانات آلوده و یا بروز علائم بیماری شامل شروع ناگهانی تب، درد عضلانی و سردرد ، پرخونی مخاط و خونریزی عمومی در بدن سریعاً به مرکز بهداشتی و درمانی مراجعه نمایید
- پنیر تازه باید حداقل به مدت دو ماه در آب نمک نگهداری شود و پس از آن مورد استفاده قرار گیرد.
- جهت پیشگیری از ابتلا به تب مالت شیر غیر پاستوریزه را پس از رسیدن به نقطه جوش و غل زدن به مدت ۳ تا ۵ دقیقه در حال بجوشانیدن و مرتب به هم بزنید.
- از مصرف خامه، بستنی و کشک غیر پاستوریزه خودداری نمایید.
- با اقدامات حفاظتی نظیر نصب توری ظریف به در و پنجره ها از ورود پشه خاکی و ابتلا به سالک پیشگیری کنیم.
- با دفع صحیح و به موقع زباله ها و جلوگیری از انباشته شدن آن از ابتلا به سالک پیشگیری کنیم .
- ابتلا هاری = مرگ حتمی

- مهمترین راه انتقال بیماری کشنده هاری گاز گرفتگی و چنگ زدن توسط حیوانات است .
- اولین و مهم ترین اقدام پس از گزش توسط حیوانات شستشو با آب و صابون می باشد.
- کیست هیداتید بیماری انگلی است که در اثر خوردن آب ،سبزیجات آلوده به تخم انگل به انسان منتقل میشود.
- ضدعفونی کردن سبزیجات وانگل زدایی آنها از ایجاد کیست هیداتید جلوگیری میکند.
- لپتوسپیروزیک بیماری قابل انتقال از حیوان به انسان است در مناطقی که بارندگی و رطوبت خاک بالا باشد دیده می شود.
- عامل بیماری لپتوسپیروزاز طریق ادرار، ترشحات تناسلی، جنین وجفت سقط شده وشیر حیوان مبتلادفع وسبب آلودگی آب مزارع میشود.
- استفاده از چکمه ودستکش توسط کشاورزان وکارکنان کشتارگاهها درپیشگیری از بیماری لپتوسپیروزموثر است.
- جهت پیشگیری از لپتوسپیروز از شنا کردن در آب برکه باید خودداری کرد.
- با مسدود کردن ترک ها وشکاف ها ونصب توری روی در وپنجره از ورود جانوران زهر آگین جلوگیری شود.
- جهت جلوگیری از گزش جانوران زهر آگین در هنگام مسافرت یا گردش در جنگل ها وپارک ها یا کوهستان که ممکن است زیستگاه مار باشد کوله پشتی ولباس را روی زمین رها نکنید.